

NUVAVIT

excellence through nutrition



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ - ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
  Rumen Aid® powder Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή με έμφαση στην ζωτικότητα των προστομάχων για μείωση του κινδύνου υποκλινικών οξέωσεων	Ζύμες (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>), Αποξηραμένα συστατικά απόσταξης σίτου (DDGS), Πρεβιοτικά (αφυδατωμένη ολιγοφρουκτόζη), Προπιονικό ασβέστιο, Ωσμορυθμιστές (Μπεταΐνη), Ρυθμιστές pH, Σύμπλεγμα Βιταμινών B (B₁, B₃, B₁₂)	Χορηγείται συμπληρωματικά με τις ζωτροφές αιγοπροβάτων και αγελάδων σε περιπτώσεις όπου ενδείκνυται η άμεση υποβοήθηση λειτουργίας των προστομάχων, του μηρυκασμού και της ρύθμισης των ζυμωτικών φαινομένων, αλλά και όταν ενδείκνυται η αύξηση πρόσληψης ξηράς ουσίας σιτηρεσίου ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονης θερμικής καταπόνησης. <u>Δοσολογία:</u> Αιγοπρόβατα: 50g/ζώο/ημέρα, Αγελάδες: 200g/ζώο/ημέρα. <u>Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης:</u> Ανάλογα με την περίπτωση και κατάσταση του ζώου μπορεί να χορηγηθεί μέσω σιτηρεσίου μέχρι 2 μήνες ή προς αρραίωση με χλιαρό νερό για άμεση χρήση για 1-3 ημέρες.	100g 3kg
  Energy Promoter® powder Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή για υποβοήθηση του ενεργειακού μεταβολισμού	Σάκχαρο, Ζύμες (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>), Πρεβιοτικά (αφυδατωμένη ολιγοφρουκτόζη), Προπιονικό ασβέστιο, β-Καροτένιο, Σύμπλεγμα Βιταμινών B (B₁, B₃, B₆, B₁₂)	Χορηγείται σε περίπτωση που ενδείκνυται ταχεία αύξηση των σακχάρων για άμεση υποβοήθηση του ενεργειακού μεταβολισμού και αύξηση της κινητικότητας και ζωτικότητας του πεπτικού συστήματος, όταν οι ανάγκες παρουσιάζονται αυξημένες ιδιαίτερα κατά το μεταβατικό στάδιο τοκετού - γαλουχίας. <u>Δοσολογία:</u> Χορήγηση μέσω σιτηρεσίου ή αρραίωση με χλιαρό νερό για άμεση χρήση μέχρι 50g ανά πρόβατο-αίγα ή 200g ανά αγελάδα ανά ημέρα για 1-3 ημέρες ανάλογα με την κατάσταση και αντίδραση του ζώου στην θεραπεία. <u>Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης:</u> 1-3 ημέρες.	100g 3kg
  Pre - Keto® Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή για την πρόληψη υποκλινικών μορφών κέτωσης και αρνητικού ισοζυγίου ενέργειας	Σάκχαρο, Προπιυλενογλυκόλη, Μελάσσα, Γλυκερίνη, Γλυκονικό ασβέστιο, Σύμπλεγμα Βιταμινών B (B₁, B₃, B₆, B₁₂)	Χορηγείται για πρόληψη των υποκλινικών μορφών μεταβολικών νόσων σε υψίπαραγωγά αιγοπρόβατα ή/και αγελάδες που σχετίζονται με το αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας κατά την περιγεννητική περίοδο όταν οι ανάγκες παρουσιάζονται αυξημένες λόγω συνθηκών καταπόνησης ή/και λόγω έντονων μεταβολικών διεργασιών. Το διάλυμα μπορεί να χορηγηθεί με απευθείας κατάποση από το ζώο ή/και κατόπιν αρραίωσης του με νερό. <u>Δοσολογία:</u> Για αιγοπρόβατα από 200ml διαλύματος ανά ζώο ανά ημέρα ή 1L διαλύματος για 5 ζώα ανά ημέρα (τελευταίο ενάμιση μήνα προ τοκετού και μέχρι και ένα μήνα από τον τοκετό). Για Αγελάδες από 1L ανά ζώο ανά ημέρα (τελευταίες 3 εβδομάδες προ τοκετού και μέχρι και ενάμιση μήνα από τον τοκετό).	1L 5L

Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ειδικού στη διατροφή ή κτηνιάτρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
 Liver-ACT® Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή για τόνωση ηπατικής λειτουργίας και υποστήριξη της προετοιμασίας οίστρου και αναπαραγωγής	 Σάκχαρα, Προπυλενογλυκόλη, Μελάσσα, Γλυκερίνη, Γλυκονικό ασβέστιο, Σύμπλεγμα Βιταμινών Β (B ₁ , B ₃ , B ₄ , B ₆ , B ₁₂), Α, Ε & Σελήνιο, Αμινοξέα (Λυσίνη, Μεθειονίνη), Ωσμωνιθμιστές (Μπεταΐνη)	Χορηγείται στις περιπτώσεις που ενδείκνυται υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας. Ιδιαίτερα για υπεραγωγές αγελάδες και αιγοπρόβατα, κατά την πρώτη φάση της γαλακτοπαραγωγής, όπου οι ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά στοιχεία που υποβοηθούν στην αντιμετώπιση του μεταβολικού και οξειδωτικού στρες μπορούν να διεγείρουν την καλύτερη λειτουργία του αναπαραγωγικού ή/και ανοσοποιητικού συστήματος. <u>Δοσολογία:</u> Αιγοπρόβατα: 200 ml/ζώο/ημέρα. Αγελάδες: 1L/ζώο/ημέρα. Ιπποειδή: 1L/ζώο/ημέρα. Άλλα θηλαστικά: 300 ml/ζώο/ημέρα <u>Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης:</u> έως 20 ημέρες.	1L 5L

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝΩΣΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΕΥΖΩΪΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
 Ivanit® wsp Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή υπό τη μορφή πλήρης υδατοδιαλυτής σκόνης πλούσια σε βιταμίνες και σίδηρο	 Δεξτρόζη, Σίδηρος, Λιποδιαλυτές βιταμίνες Α, D ₃ , Ε, Κ, Ύδατοδιαλυτές βιταμίνες (B ₁ , B ₃ , B ₅ , B ₇ , B ₁₂ , C)	Χορηγείται σε περιπτώσεις που ενδείκνυται συμπληρωματική διατροφή για την αντιμετώπιση των πρωτογενών και δευτερογενών υποβιταμίνωσεων ιδιαίτερα όταν οι ανάγκες παρουσιάζονται αυξημένες λόγω καταπόνησης θερμικού - οξειδωτικού στρες, μετακίνησης ζώων ή/και τόνωσης του ανοσοποιητικού συστήματος. <u>Δοσολογία:</u> Χοίροι, Βοοειδή, Πρόβατα, Ερίφια: Κατά περίπτωση πρέπει να χορηγείται στο πόσιμο νερό, σε ποσότητα τόσο ώστε το κάθε ζώο να λαμβάνει έως και 5g/ημέρα. Πτηνά: Κατά περίπτωση πρέπει να χορηγείται στο πόσιμο νερό, σε ποσότητα τόσο ώστε το κάθε ζώο να λαμβάνει έως και 2g/ημέρα. <u>Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης:</u> 2 έως 15 ημέρες. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου ή διατροφολόγου όπως και για την τροποποίηση της περιόδου χρήσης.	50g
 Euravit® wsp Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή υπό τη μορφή πλήρης υδατοδιαλυτής σκόνης πλούσια σε βιταμίνες συμπλέγματος Β	 Δεξτρόζη, Λιποδιαλυτές βιταμίνες D ₃ , Ε, Κ Ύδατοδιαλυτές βιταμίνες (B ₁ , B ₂ , B ₃ , B ₅ , B ₆ , B ₉ , B ₁₂)	Χορηγείται σε περιπτώσεις που ενδείκνυται συμπληρωματική διατροφή για την αντιμετώπιση των πρωτογενών και δευτερογενών υποβιταμίνωσεων ιδιαίτερα όταν οι ανάγκες παρουσιάζονται αυξημένες λόγω καταπόνησης θερμικού - οξειδωτικού στρες, μετακίνησης ζώων ή/και τόνωσης του ανοσοποιητικού συστήματος. <u>Δοσολογία:</u> Μοσχάρια, Πρόβατα, Κατσίκες, Ιπποειδή: Κατά περίπτωση πρέπει να χορηγείται στο πόσιμο νερό, σε ποσότητα τόσο ώστε το κάθε ζώο να λαμβάνει έως και 2,5g/ημέρα. Χοίροι: Κατά περίπτωση, πρέπει να χορηγείται στο πόσιμο νερό, σε ποσότητα τέτοια ώστε το κάθε ζώο να λαμβάνει έως και 1,5g/ημέρα. Πουλερικά: 100g EURAVIT® την ημέρα για 2.500 νεοσσούς ή 2.000 πουλάδες, ή 1.250 όρνιθες ωοτοκίας. Διαλύστε 100g EURAVIT® σε 10L νερό και προσθέστε αυτό το διάλυμα στο πόσιμο νερό της ημερήσιας κατανάλωσης. <u>Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης:</u> 3 - 5 ημέρες. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου ή διατροφολόγου όπως και για την τροποποίηση της περιόδου χρήσης.	100g

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
 Adelevit® Διαιτητική συμπληρωματική ζωτροφή υπό τη μορφή πλήρους υδατοδιαλυτού διαλύματος	 Βιταμίνες A, D₃, E, C, Αμινοξέα (Λυσίνη : Μεθειονίνη), Σελήνιο, Γλυκερίνη	Χορηγείται σε περιπτώσεις που ενδείκνυται συμπληρωματική διατροφή σε βιταμίνες, οριακά αμινοξέα και ιχνοστοιχεία, ή/και όταν οι ανάγκες παρουσιάζονται αυξημένες μετά από εμβολιασμό, ή/και όταν ενδείκνυται προσαρμογή σε αλλαγές της διατροφής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις θερμικού - οξειδωτικού στρες, μετακίνησης ζώων, ή/και τόνωσης του αναπαραγωγικού και ανοσοποιητικού συστήματος. <u>Δοσολογία:</u> Μηρυκαστικά, Πουλερικά, Χοίροι, Κόνικλοι: Κατά περίπτωση, πρέπει να χορηγείται στο πόσιμο νερό, σε ποσότητα τέτοια ώστε κάθε ζώο να λαμβάνει από 1 έως μέγιστο 4ml/ημέρα. <u>Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης:</u> 2 έως 15 ημέρες. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη κτηνιάτρου ή διατροφολόγου όπως και για την τροποποίηση της περιόδου χρήσης.	1L 5L
 Vita-LIQ® powder Σύνθετη συμπληρωματική ζωτροφή πλήρης σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και οριακά αμινοξέα	 Σάκχαρα Πλήρης σύνθεση λιποδιαλυτών (A, D, E, K) & υδατοδιαλυτών βιταμινών (B, C), Ενώσεις ιχνοστοιχείων (I, Co, Se), Χηλικές ενώσεις ιχνοστοιχείων (Zn, Fe, Mn), Αμινοξέα (Λυσίνη : Μεθειονίνη)	Χορηγείται σε περιπτώσεις που απαιτείται συμπληρωματική διατροφή σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και σε αμινοξέα. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως: κατά την προγεννητική περίοδο, λόγω καταπόνησης, θερμικού - οξειδωτικού στρες, μετακίνησης των ζώων, τόνωσης του αναπαραγωγικού και ανοσοποιητικού συστήματος, μετά από εμβολιασμό, ή και όταν ενδείκνυται προσαρμογή σε αλλαγές της διατροφής. <u>Δοσολογία:</u> Αιγοπρόβατα: Προσθέστε 2 - 5g Vita-LIQ® powder σε 1 kg ζωτροφής (<5g/ζώο/ημέρα). Βοοειδή: Προσθέστε 10 - 15g Vita-LIQ® powder σε 1 kg ζωτροφής (<15g/ζώο/ημέρα). Αμνοερίφια & Χοίροι: Προσθέστε 1 - 2g Vita-LIQ® powder σε 1 kg ζωτροφής (<2g/ζώο/ημέρα). Πουλερικά & Κόνικλους: Προσθέστε 1 - 2g Vita-LIQ® powder σε 1 kg ζωτροφής (<2g/ζώο/ημέρα). <u>Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης:</u> 2 έως 15 ημέρες. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός διατροφολόγου ή κτηνιάτρου, πριν από τη χρήση και την παράταση της περιόδου χρήσης.	100g 3kg
 Vita-LIQ forte® Διαιτητική συμπληρωματική ζωτροφή πλήρης σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και οριακά αμινοξέα υπό τη μορφή πόσιμου διαλύματος	 Μελάσσα, Προπυλενογλυκόλη, Πλήρης σύνθεση λιποδιαλυτών (A, D, E, K) & υδατοδιαλυτών βιταμινών (B, C), Ωσμωνιθμιστές (Μπεταΐνη), Ενώσεις ιχνοστοιχείων (I, Co, Se), Χηλικές ενώσεις ιχνοστοιχείων (Zn, Fe, Mn), Αμινοξέα (Λυσίνη : Μεθειονίνη)	Χορηγείται σε περίπτωση που ενδείκνυται συμπληρωματική διατροφή σε βιταμίνες, οριακά αμινοξέα και ιχνοστοιχεία, με στόχο την μακροπρόθεσμη παροχή τους, όταν οι ανάγκες παρουσιάζονται αυξημένες. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως: κατά την προγεννητική περίοδο, λόγω καταπόνησης, θερμικού - οξειδωτικού στρες, μετακίνησης των ζώων, τόνωσης του αναπαραγωγικού και ανοσοποιητικού συστήματος, μετά από εμβολιασμό, ή και όταν ενδείκνυται προσαρμογή σε αλλαγές της διατροφής. <u>Δοσολογία:</u> Αιγοπρόβατα: Μέχρι 2ml/ζώο/ημέρα. Βοοειδή: Μέχρι 5ml/ζώο/ημέρα. <u>Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης:</u> Έως 12 μήνες. Πριν από τη χρήση συνιστάται να ληφθεί η συμβουλή από κτηνίατρο ή διατροφολόγο σχετικά με το ισοζύγιο των ιχνοστοιχείων του ημερήσιου σιτηρεσίου.	1L 5L

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΡΑΤΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΗΛΩΝ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΟΡΙΑΚΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
 Nutri-Hoof₃[®] powder Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή για την υποστήριξη της ανάπτυξης των οπλών και τόνωσης ενζυμικών διεργασιών ανοσοποιητικού συστήματος 	Ζύμες (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) Ασβέστιο, Φώσφορο, Μαγνήσιο, Βιοτίνη B₇, Βιταμίνη E, Συνδυασμοί ενεργών μορφών ιχνοστοιχείων Zn, Mn, Se (Χηλικά : Υδροξυανάλογα : Οξείδια)	Χορηγείται συμπληρωματικά στα σιτηρέσια των παραγωγικών ζώων για την τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος και για την υποστήριξη της ανάπτυξης των οπλών, της αναγέννησης του δέρματος και των αποφύσεων. Συμβάλει στην υγιεινή του μαστού με περιορισμό των σωματικών κυτάρων σε αγελάδες - αιγοπρόβατα και περιορισμό του οξειδωτικού στρες σε χοίρους, κρεοπαραγωγά και αυγοπαραγωγά ορνίθια. <u>Δοσολογία:</u> Αιγοπρόβατα: 1 - 2 γεύματα/ζώο και έως 50g ανά ημέρα. Βοοειδή: 6 - 8 γεύματα/ζώο και έως 200g ανά ημέρα. Πουλερικά - Χοίροι: 2 - 4 γεύματα/ζώο και έως 50g ανά ημέρα. Ιπποειδή: 2 - 4 γεύματα/ζώο και έως 50g ανά ημέρα. <u>Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης:</u> Έως 8 εβδομάδες. Για μηρυκαστικά έως 6 μήνες.	100g 3kg
 Amino Plus[®] powder Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή με έμφαση στην κάλυψη των αναγκών σε οριακά αμινοξέα λυσίνης και μεθειονίνης 	Θερμικά επεξεργασμένο συμπύκνωμα πρωτεϊνών σογιαλευρου, Αμινοξέα (Λυσίνη : Μεθειονίνη), Ωσμωνιθμιστές (Μπεταΐνη), Θεϊκό νάτριο	Χορηγείται συμπληρωματικά στις ζωοτροφές πάχυνσης και γαλακτοπαραγωγής αιγοπροβάτων και αγελάδων υψηλών αποδόσεων, όπου οι ανάγκες σε οριακά αμινοξέα Λυσίνη και Μεθειονίνη (LYS:MET - 1,25:1) κρίνεται αυξημένη αλλά και για την υποβοήθηση της πρωτεϊνοσύνθεσης. Υποβοηθά την καλύτερη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, βελτιώνει το ρυθμό ανάπτυξης, την ποιότητα σε σφάγιο σε κρεοπαραγωγά ορνίθια, χοιρίδια πάχυνσης και βελτιώνει τον ογκό αυγών σε αυγοπαραγωγές ορνίθες <u>Δοσολογία:</u> Αιγοπρόβατα: μέχρι 50g ανά ημέρα. Βοοειδή: μέχρι 200g ανά ημέρα. Πουλερικά-Χοίροι: μέχρι 25g ανά ημέρα. <u>Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης:</u> Μηρυκαστικά: Από το τελευταίο στάδιο εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής. Πουλερικά: Σιτηρέσια ωοτοκίας - ανάπτυξης - πάχυνσης. Χοίροι: Σιτηρέσια σύων - ανάπτυξης - προ-πάχυνσης - πάχυνσης - τελικής πάχυνσης.	100g 3kg

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΨΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
 I-Guard[®] powder Διαιτητική συμπληρωματική ζωοτροφή υπό τη μορφή πλήρης υδατοδιαλυτής σκόνης σε νερό και σε ρόφημα υποκατάστατου γάλακτος (ισότονο διάλυμα) 	Σάκχαρο, Πρεβιοτικά (αφυδατωμένη ολιγοφρουκτόζη), Γλυκίνη, Βιταμίνη B₁, Βιταμίνη E, Χλωριούχα ιόντα Νατρίου - Καλίου	Συνιστάται για την σταθεροποίηση ισοζυγίου νερού - ηλεκτρολυτών και την υποστήριξη φυσιολογικής πέψης σε περιπτώσεις όπου απαιτείται πρόληψη κινδύνου πεπτικών διαταραχών ή/και κατά την διάρκεια ή/και κατά την ανάρρωση από περιπτώσεις έντονης απώλειας υγρών και διάρροιας <u>Δοσολογία:</u> Συνιστώμενη δοσολογία προς αρραίωση για μόσχους ή/και αμνοερίφια, 25g υδατοδιαλυτής σκόνης προς 1L γάλακτος ή/και ροφήματος γάλακτος (μίγμα σκόνης γάλακτος με νερό). Σε περιπτώσεις έντονης διάρροιας συνιστάται η αντικατάσταση μέχρι και 2-4 γευμάτων γάλακτος (1-2 ημέρες) με διάλυμα 50g υδατοδιαλυτής σκόνης προς 1L νερό και με προσοδευτική επαναφορά 2-4 γευμάτων γάλακτος (1-2 ημέρες) με 25g υδατοδιαλυτής σκόνης προς 1L γάλακτος ή/και ροφήματος γάλακτος μέχρι πλήρους σταθεροποίησης. <u>Συνιστώμενη διάρκεια χορήγησης:</u> 1 έως 7 ημέρες.	100g 3kg



PROVET
ANIMAL HEALTH CARE

Εξυπηρέτηση Πελατών:
Νικ. Φωκά & Αγ. Αναργύρων
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
info@provet.gr

Παραγγελίες: Τηλ.: 210 55 08 700
Κέντρο: Τηλ.: 210 55 08 500